

NOV 22 1911
EXCHANGE

*Results of version for mother
& child in 368 cases*

Cane Medical Library

Erfolg der Wendung für Mutter und Kind in 368 Fällen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. B. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Fritz Baumann,

Medizinalpraktikant.



□ □ □

MÜNCHEN 1910.

Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callwey.

Erfolg der Wendung für Mutter und Kind in 368 Fällen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

hohen medizinischen Fakultät


der

Kgl. B. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Fritz Baumann,

Medizinalpraktikant.



MÜNCHEN 1910.

Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callwey.

Gedruckt mit Genehmigung der hohen medizinischen
Fakultät der Universität München.

Referent: Herr Geheimrat Prof. Dr. Döderlein.

In folgender Arbeit standen uns die Geburtsjournale der Münchener Universitätsfrauenklinik, sowie die Geburtsberichte der Kgl. Hebammenschule zu München seit dem Jahre 1900 zur Verfügung. Während dieser Zeit war Herr Geheimrat v. Winckel bis Oktober 1907, dann Herr Professor Dr. Döderlein Vorstand der Klinik. Es folgen nun die Auszüge aus den 368 einschlägigen Geburtsjournalen, in denen über die Wendung und deren Erfolg für Mutter und Kind berichtet ist. Vorauszuschicken ist noch, dass bei eventuellen Temperatursteigerungen jeweils die höchste Tagestemperatur angegeben wurde.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bermer- kungen
R. Chr., 42 Jhr., XIV p.	Querlage	direkt	M. m. vollst. erweit. sofort. Extr. Sink. d. kdl. Herzt.	gesund entl.	ausgetr., cyanot., nach 2 Tg. †	
St. M., 31 Jhr., V p.	Querlage	(innere- comb.) direkt	M. m. handt. gr. sof. Extr. Sink. d. kdl. Herzt.	fieberfrei, gesund entl.	ausgetr., asphykt. 1°, wieder be- lebt	
P. M., 36 Jhr., IX p.	Querlage. Plac. praev.	direkt	M. m. nicht ganz erweitert, sof. Extrakt. Sink. u. Aufh. d. kdl. Herzt.	fieberfrei, gesund entl.	ausgetr., Bef. nach 6 Tagen gut	
Th. R., 16 Jhr., I p.	Querlage d. 2. Zwillings	direkt	M. m. vollst. erweitert, sof. Extr.	gesund, kein Fieber	47 cm, 2350 gr, gesund	
B. M., 34 Jhr., VII p.	Querlage. Becken normal	direkt	M. m. vollst. erweitert, sof. Extr. Aufh. d. kdl. Herzt.	gesund, kein Fieber	52 cm, 2850 gr, Kind wohl	
M. F., 38 Jhr., X p.	Querlage. Becken norm. Arm- vorfall	direkt	M. m. vollst. erweitert, sof. Extr.	gesund, kein Fieber	48 cm, 2750 gr, Kind wohl	
H. B., 37 Jhr., II p.	Querlage. Armvorfall des 2. Kindes von Zwill.	direkt	M. m. vollst. erweitert, sof. Extr. Wehen- schwäche	gesund, kein Fieber	49 cm, 2700 gr Kind wohl	
St. F., 32 Jhr. III p.	Querlage. Platt rha- chit. Becken	direkt	M. m. fast vollst. erweit., sof. Extr. Auf- hören d. kdl. Herzt.	gesund, kein Fieber	50 cm, 2700 gr, †, Obersch- Fraktur	
W. B., 35 Jhr., IV p.	Querlage. Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. handt. gross. Sof. Extr. Sink. d. kdl. Herzt.	gesund, kein Fieber	52 cm, 3200 gr, II° asphykt., wied. belebt	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
M. K., 42 Jhr., XIII p.	Querlage. Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. fast vollst. erweit. Sof. Extr. Nabelschnur pulslos	Befinden gut, kein Fieber	50 cm, 2950 gr, †	Cervixriss.
W. V., 45 Jhr., XVI p.	Querlage	direkt	M. m. fast vollst. erweit. Sof. Extr. Ab- gang v. Mekon.	Befinden gut, kein Fieber	52 cm, 3210 gr, 1° asphykt., wied. belebt, † nach 3 Tg.	
B. A., 25 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. vollst. erweit. Sof. Extr. Sink. d. kdl. Herztöne	Fieber am 4. Tg. 39.1, 5. „ 39.3, 6. „ 37.8, dann fie- berfrei, ges. entl.	54 cm, 3500 gr, 2° asphykt., wied. belebt, gesund	
Kl. M., 27 Jhr., II p.	Querlage	comb. (Braxt. Hicks)	M. m. 5 M. stk. gross. Extr. nach völlig erweit. M. m.	Befinden gut, kein Fieber	49 cm, 2800 gr, gesund	
K. M., 31 Jhr., III p.	Querlage d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. vollst. erweit. Sof. Extr. Abgang v. Mekonium	Befinden gut, kein Fieber	50 cm, 2850 gr, gesund	
M. M., 26 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herzt.	Fieber am 3. Tg. 38.6, 4. „ 37.5, 5. „ 38.1, 6. „ 38.2, dann fie- berfrei	53 cm, 3200 gr, 2° asphykt., gesund entl.	
O. M., ? Jhr., IV p.	Querlage	direkt	M. m. fast völlig erweit. Sof. Extr.	fieberfrei, gesund entl.	48 cm, 2700 gr, 3° asphykt., wied. belebt	
Th. M., 37 Jhr., VI p.	Querlage	comb. (Braxt. Hicks)	M. m. 5 M., stückgross, nach 5 Minut. völlig erw. M. m. Extrakt.	kein Fieber, ges. entl.	Part. prae- maturus (28. Woche) 40 cm, 1460 gr. † nach 1 St.	Frucht- blase war gesprun- gen, übel- riechender Ausfluss aus den Genital.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
H. M., 28 Jhr., III p.	Querlage d. 2. Kindes v. Zwill. Sink. d. Herzt.	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herzt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3400 gr, gesund	
E. E., 32 Jhr., VII p.	Querlage. Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sinken d. kdl. Herzt. Sofort Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	Part. prae- maturus (VIII. m.) 40 cm, 1620 gr, †	
A. K., 30 Jhr., VIII p.	Querlage	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extr. Abgang v. Mekonium	kein Fie- ber, ge- sund entl.	54 cm, 4520 gr, gesund entl.	Fractura humeri dextri des Kindes.
H. A., 29 Jhr., III p.	Querlage. Conj. diag. 10.5	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herztöne	Fieber am 2. Tage 38.2, dann fieberfrei, ges. entl.	52 cm, 3460 gr, gesund	Hydram- nion.
K. J., 31 Jhr., V p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Extr. nach 8 Minut. Sink. d. kdl. Herzt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2900 gr, I° asphykt., wieder be- lebt, gesund	
R. K., 34 Jhr., IX p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Steizen der kdl. Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3380 gr, lebt	Fraktur d. rechten Humerus.
Sch. K., 35 Jhr., VI p.	Querlage	direkt	M. m. fast erweitert. Sof. Extr. Gefahr d. Kindes	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3240 gr, gesund	
K. B., 39 Jhr., III p.	Querlage	direkt	M. m. hand- tellergröss. Langs. Extr. Gefahr d. Kind.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	55 cm, 3190 cm, III° asphykt., †	
L. R., 43 Jhr., VII p.	Querlage. Placenta praevia	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 4 Fin- ger durchgän- gig. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3000 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
M. M., 29 Jhr., III p.	Querlage. Conj. diag. 10.5	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Steigen d. kdl. Herztöne	kein Fieber, ges. entl.	52 cm, 3360 gr (ohne Gehirn) †	Perforat. des nachf. Kopfes; Nabel- schnur war pulslos!
B. A., 35 Jhr., IV p.	Abgewich. Kopf, d. nicht dauernd in d. Becken zu bringen ist	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herztöne	Fieber am 3. Tg. 37.6, 4. „ 37.1, 5. „ 39.2, dann fie- berfr., ge- sund	46 cm, 2420 gr, II° asphykt., wied. belebt, † am 6. Tage	Dammriss II°
H. A., 28 Jhr., VI p.	Querlage d. ersten Kind. v. Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Aufh. d. Herz- töne. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 4. Tg. 39.0, dann fie- berfrei, gesund entl.	48 cm, 2650 gr, †	
H. A., 28 Jhr., VI p.	Querlage d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herztöne	Fieber am 4. Tg. 39.0, dann fie- berfrei, gesund entl.	51 cm, 2950 gr, I° asphykt., gesund	
Sch. F., 24 Jhr., III p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. Herz- töne	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3520 gr, gesund	
K. F., 25 Jhr., II p.	Querlage. Vorfall bei- der Arme	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fieber, ges. entl.	50 cm, 3360 gr, gesund	Dammriss I°
U. A., 31 Jhr., X p.	Querlage. Fieber der Mutter 38.9. Conj. ext. 17.0	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extrakt. (In- teresse der Mutter)	Fieber am 1. Tg. 37.0, 2. „ 37.0, 3. „ 38.1, 4. „ 38.1, 5. „ 38.0.	41 cm, 1130 gr, †	Perfora- tion des nachf. Kopfes

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
M. Ch., 23 Jhr., III p.	Querlage. Vorfall der recht. Hand	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Aufhören der Herztöne	Fieber am 1. Tg. 37,9, 2. „ 37,6, 3. „ 37,5, 4. „ 38,8, 5. „ 39,9, 6. „ 39,2, 7. „ 38,0, 8. „ 38,0, dann fie- berfrei	50 cm, 3250 gr, †	
St. M., 28 Jhr., V p.	Querlage. Placenta praevia. Armvorfall. Nabel- schnurvorf.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Gefahr des Kindes.	Fieber am 4. Tg. 37,4, 5. „ 39,5, 6. „ 38,5, dann fie- berfrei	49 cm, 3020 gr, gesund	
L. T., 21 Jhr., III p.	Querlage. Nabel- schnurvorf.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	51 cm, 3290 gr, asphykt. III ^o †	
L. K., 23 Jhr., III p.	Querlage	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Finger durch- gängig, später Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	47 cm, 2200 gr, †	
St. A., 26 Jhr., I p.	Querlage	direkt	M. m. nicht völlig erwei- t. Spontan- geburt	Fieber am 2. Tg. 37,6, 3. „ 37,6, 4. „ 38,1, dann fie- berfrei, gesund entlassen	52 cm, 3120 gr, † während d. Geburt	
P. K., 39 Jhr., VI p.	Querlage	direkt	M. m. völlig errweitert. Sof. Extrakt Asphyxie des Kindes	Fieber am 1. Tg. 37,8, dann fie- berfrei, ges. entl.	49 cm, 2730 gr, †	
Sch. A., III p.	Querlage	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. 5 M. stückgr. Spon- tane Geburt. Veit-Smellie	kein Fie- ber, ge- sund entl.	45 cm, 2250 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
E. R., 39 Jhr., VIII p.	Querlage. Placenta praevia lateral.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Steigen d. kdl. Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2270 gr, gesund	
N. M., 22 Jhr., II p.	Querlage. Conj. diag. 10.5	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extr. Sinken d. kdl. Herzt.	Fieber am 4. Tg. 37.6, ges. entl.	53 cm, 3100 gr, †	
R. E., 29 Jhr., II p.	Querlage. Conj. diag. 10.0	direkt	M. m. völlig erweitert. Extr. gelingt nicht	Fieber am 1. Tg. 37.6, dann fie- berfrei, ges. entl.	50 cm, 2500 gr, (ohne Gehirn) †	Perfora- tion des nachfolg. Kopfes, da das Kind bereits tot.
S. E., 26 Jhr., IV p.	Querlage. Conj. diag. 10.5	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Extrakt. nach Erweiterg. d. M. m.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 3420 gr, II° asphykt., †	
G. W., 23 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. fast völlig erweit. Sof. Extrakt.	Fieber am 3. Tg. 38.2, 4. „ 39.1, 5. „ 39.0, 6. „ 38.0, 7. „ 39.1, 8. „ 37.8, 9. „ 37.6, 10. „ 37.6, dann fie- berfr., ges.	52 cm, 5200 gr, gesund	
S. K., 22 Jhr., I p.	Querlage. Conj. ext. 17 ¹ / ₂	indirekt (Braxt.- Hicks)	Spontane Ge- burt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	31 cm, 670 gr, †	
L. C., 29 Jhr., IV p.	Querlage. Conj. ext. 18 ¹ / ₂	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Gefahr des Kindes	Fieber am 1. Tg. 37.8, dann fie- berfrei, gesund	55 cm, 3620 gr, † nach der Geburt	
G. K., 29 Jhr., III p.	Querlage. Blutung	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Zuggewicht, dann Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3140 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
H. A., 36 Jhr., V p.	Querlage	direkt	Metreuryse. M. m. für die Hand durchg. Sof. Extrakt. Aufh. d. Herz- töne	Fieber am 3. Tg. 37.3, 4. „ 37.5, 5. „ 37.3, gesund entl.	45 cm, 2050 gr, †	
R. F., 32 Jhr., VIII p.	Querlage	direkt	M. m. fast völlig erweit. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 2350 gr, gesund	
E. A., 25 Jhr., II p.	Querlage. Vorfall d. r. Hand	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herztöne	Fieber am 3. Tg. 39.5, 4. „ 37.9, dann fie- berfrei, gesund	55 cm, 3250 gr. †	
F. F., 28 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Spont. Geburt. Armlösg. Veit Smellie	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 2800 gr, †	bereits vor d. Wendg. keine Herz- töne mehr.
P. Th., 22 Jhr., I p.	Querlage d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Langsame Extraktion	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2200 gr, gesund	
D. K., 29 Jhr., I p.	Querlage d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 3. Tg. 37.9, dann fie- berfrei, ges. entl.	45 cm, 2000 gr, gesund	
B. C., 28 Jhr., III p.	Querlage. Arm u. Na- belschnur- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 5. Tg. 39.0, 6. „ 38.8, 7. „ 38.8, 8. „ 37.6, 9. „ 38.5, dann fie- berfrei, ges. entl.	50 cm, 2700 gr, †	
A. E., 29 Jhr., IV p.	Querlage. Arm u. Na- belschnur- vorfall	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 2700 gr, 1° maceriert, †	Cervixriss.


Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
B. Th., X p.	Querlage	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	Fieber am 5. Tg. 40.4, 6. „ 37.6, dann fie- berfr. entl.	30 cm, 1200 gr, †	künstl. Frühge- burt, Ei hautstich. wegen Phthise.
H. M., 27 Jhr., II p.	Querlage d. 2. Kindes von Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2550 gr, gesund	
B. M., 31 Jhr., IX p.	Querlage	direkt	M. m. hand- tellergröss. Zuggewicht. Armlösung	kein Fie- ber, ge- sund entl.	42 cm, 1550 gr, †	
L. F., 21 Jhr., I p.	Querlage	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 4 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 4200 gr, †	
P. M., 20 Jhr., I p.	Querlage	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	44 cm, 2050 gr, †	
K. M., 26 Jhr., III p.	Querlage Nabel- schnurvor- fall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Verlangs. der Herztöne	Fieber am 4. Tg. 37.5, 5. „ 37.5, dann fie- berfrei, ges. entl.	51 cm, 3250 gr, gesund	
M. Th., 24 Jhr., I p.	Querlage	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Extrakt. bis zur Schul- ter. Hyterotomie	feieberfrei, gesund entlassen	49 cm, 2650 gr, asphykt., wieder be- lebt, gesund	Hystero- tomie.
G. E., 26 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3100 gr, asphykt., wied. belebt	
A. Th., 28 Jhr., V p.	Querlage d. 2. Kindes von Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	45 cm, 2200 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
R. B., 27 Jhr., V p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Kindl. Herz- töne 200	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2550 gr, asphykt., wieder be- lebt	
Z. M., 25 Jhr., III p.	Querlage. Tympania uteri	direkt	M. m. 5 M. stek. gross. Evis- ceration. Wen- dung sof. Ex- trakt. Perf. d. nachf. Kopfes	† post operat.	†	
Sch. Th., 30 Jhr., V p.	Querlage. Becken I° verengt. Conj. vera 10	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. 3 M. stek. gross. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 2300 gr, †	künstl. Frühgeb. wegen eng. Beckens.
W. F., 29 Jhr., III p.	Querlage. Becken ver- engt. Conj. vera 8	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 3600 gr, gesund	
F. Th., 38 Jhr., XI p.	Querlage. Conj. vera 8	direkt	Colpeuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2600 gr, gesund	künstl. Frühgeb.
K. E., 22 Jhr., I p.	Querlage. Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. klein- handtellergr. sof. Extrakt. Nabelschnur puls. schwach	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 3500 gr, asphykt. II°. † nach 1 Std.	
M. M., 32 Jhr., VI p.	Querlage. Blutung	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2700 gr, gesund	
G. A., 38 Jhr., VII p.	Querlage. Conj. diag. 10 1/4	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig Colpeu- ryse. M. m. völ- lig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	38 cm, 1700 gr †	Künstl. Frühgeb. Fraktur d. Wirbel- säule.
S. F., 38 Jhr., IV p.	Querlage	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- traktion	Fieber am 7. Tg. 39.7, 18. „ 39.8, dann fie- berfrei, ges. entl.	43 cm, 1700 gr, †	Hystero- tomie; künstl. Frühgeb., da bis jetzt kein leb. Kind.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
L. K., 30 Jhr., III p.	Querlage. Conj. diag. 10.5	direkt	M. m. völlig erweitert (d. Bossiu. Col- peurynter). Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	45 cm, 2000 gr, gesund	
M. M., 29 Jhr., III p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 2. Tg. 38.0, 3. „ 38.6, 4. „ 37.5, 5. „ 38.1, 6. „ 38.2, 7. „ 38.5, 8. „ 38.3, dann fie- berfr., ges.	51 cm, 3500 gr, gesund	
B. M., 32 Jhr., III p.	Querlage	direkt	M. m. nicht völlig erwei- tert. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2800 gr, † II ^o macer.	
Z. K., 34 Jhr., VI p.	Querlage. Conj. diag. 11.5	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 3200 gr, gesund	Heboste- otomie.
P. S., 39 Jhr., XII p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 3200 gr, gesund	Cervixriss.
C. E., 24 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3480 gr, gesund	
K. K., 43 Jhr., XIV p.	Querlage. Placenta praev. marg. Blutung	direkt	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 4. Tg. 40.0, 5. „ 39.2, 6. „ 38.4, d. gesund	52 cm, 3320 gr, gesund	Hystero- tomie.
St. M., 31 Jhr., III p.	Querlage. Conj. diag. 11	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 3150 gr, gesund	
R. M., 24 Jhr., II p.	Querlage. Armvorfall. Conj. vera 8	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.5, dann fie- berfr., ge- sund entl.	42 cm, 1650 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
E. M., 22 Jhr., I p.	Querlage d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.5, 2. „ 38.0, 3. „ 38.8, 4. „ 38.0, 5. „ 38.0, 6. „ 38.0, 7. „ 38.6, dann fie- berfr., ges.	47 cm, 2600 gr, gesund	
H. K., 20 Jhr., IV p.	Querlage	comb. (Braxt.- Hicks)	M. nicht völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.0, 2. „ 38.0, 3. „ 38.9, 4. „ 38.0, 6. „ 38.0, 7. „ 38.0, dann fie- berfr., ges.	48 cm, 2960 gr, gesund	Cervixris.
St. A., 29 Jhr., V p.	Querlage. Conj. diag. 10	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sundentl.	53 cm. 4050 gr, gesund	Femur- fraktur
B. M., 26 Jhr., IV p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sundentl.	51 cm, 3700 gr, gesund	
Sch. B., 32 Jhr., V p.	Querlage	direkt	M. m. nicht völlig erwei- tert. Extrakt. nach Erw. d. M. m.	kein Fie- ber, ge- sundentl.	50 cm, 3100 gr, gesund	
R. A., 31 Jhr., V p.	Querlage (verschleppt)	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sundentl.	53 cm, 3220 gr, III° asphykt., † nach 6 Std.	
S. M., 35 Jhr., VIII p.	Querlage. Sink. d. kdl. Herztöne	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Gef. d. Kindes	kein Fie- ber, ge- sundentl.	52 cm, 4170 gr, gesund	
Sch. A., 24 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sundentl.	42 cm, 1920 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
S. M., 35 Jhr., X p.	Querlage. Allgem. ver- engtes Bek- ken. Conj. ext. 18. Be- schleunig. d. kdl. Herztz.	direkt	Metreuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2550 gr, †	
M. F., 31 Jhr., VI p.	Querlage. Conj. ext. 18 ^{1/2}	direkt	Metreuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	43 cm, 2000 gr, †	
K. Ch., 22 Jhr., II p.	Querlage. Conj. diag. 11. 5	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Spon- tan geb.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2640 gr, gesund	
D. A., 30 Jhr., II p.	Querlage. Conj. diag. 9 ^{1/2}	direkt	Metreuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3150 gr, II° asphykt., wiederbel., gesund	Künstl. Frühgeb.
H. F., 33 Jhr., V p.	Querlage. Ungewöhnl. gross. Kopf	direkt	M. m. völlig erweitert. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	55 cm, 4100 gr, †	Perforat. des nachf. Kopfes.
K. M., 25 Jhr., IV p.	Querlage. L. Armvorf.	direkt	M. m. völlig erweit. Sof. Extr. Puls. Nabelschnur	kein Fie- ber, ge- sund entl.	55 cm, 3950 gr, †	
P. J., 25 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt., da Nabelschn. pulslos	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3170 gr, †	
P. A., 25 Jhr., II p.	Querlage	direkt	M. m. handt- gross. Zugge- wicht. Spont. Geburt	Fieber am 1. Tg. 39.5, 2. „ 37.7, 3. „ 37.7, dann fie- berfr., ge- sund entl.	41 cm, 1700 gr, †	



Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
Sch. M., 35 Jhr., VII p.	Querlage. Nabel- schnurvor- fall	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Sof. Extrakt. Perforation d. nachf. Kopfes	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 2970 gr, †	
P. J., 26 Jhr., III p.	Querlage. Conj. diag. 10.5	direkt	M.m. völliger- weitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herzt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3370 gr, gesund	
St. A., 26 Jhr., IV p.	Querlage. Conj. ext. 18.0	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	55 cm, 4070 gr, gesund	
St. S., 34 Jhr., VI p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Langs. Extr.	Fieber v. 7.—31. Tg. zwischen 39.0 u. 38.0. dann fie- berfr., ge- sund entl.	45 cm, 3580 gr, †	
G. K., 41 Jhr., XIII p.	Querlage (verschleppt)	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3640 gr, †	
M. L., 26 Jhr., III p.	Querlage	direkt	M. m. handt- gross. Sof. Extrakt.	Blutung ins Abdo- men La- parotomie † post op.	43 cm, 1690 gr, †	Cervixriss III ^o .
G. M., 37 Jhr., VII p.	Querlage. Nabel- schnurvorf.	direkt	M. m. hand- tellergr. gross. Spont. Geb.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	54 cm, 3530 gr, †	
B. B., 27 Jhr., III p.	Querlage	direkt	M.m. 3M. stek- gross. Sof. Extr.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 2550 gr, gesund	Hystero- tomie.
H. K., 17 Jhr., I p.	Querlage. Nabel- schnurvorf.	direkt	M. m. klein- handtellergr. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herzt.	Fieber am 1. Tg. 39.5, 2. " 39.0, 3. " 39.0, 4. " 39.5, 5. " 39.5, 6. " 38.0, 7. " 38.0, dann fie- berfr., ges.	44 cm, 2530 gr, †	Perforat. des nachf. Kopfes. Cervixriss.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
R. M., 28 Jhr., V p.	Querlage	direkt	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 3. Tg. 39.5, 4. „ 39.0, 5. „ 38.7, 6. „ 38.5, 7. „ 38.5, 8. „ 39.0, 9. „ 38.8, dann fie- berfrei, gesund	ausgetrag., †	Hystero- tomie.
B. Th., 38 Jhr., V p.	Querlage	direkt	M. m. völliger- weitert. Extr. nach 1 Std. Verlängs. der Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 3250 gr, II° asphykt., wied. belebt, gesund	
W. M., 33 Jhr., IV p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2850 gr, gesund	Claviku- larfraktur.
R. A., 34 Jhr., VIII p.	Querlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3420 gr, gesund	
Sch. Th., 27 Jhr., V p.	Placenta præv. marg. Blutung	innere	M. m. vollst. erweit. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herzt.	3 tg. Fie- ber 38.8° ges. entl.	1750 gr, asphykt. III°, †	
F. M., 21 Jhr., I p.	Placenta præv. centr. Temp. 39.6	? (direkt)	M. m. 5 M. stek- gross. Extr. sof. ? (nach erweit. M. m.)	5 tg. Fie- ber 38.2, 39.4, 38.8, 39.2, 39.4, †	55 cm, 3500 gr, maceriert, †	
P. M., 29 Jhr., III p.	Placenta præv. later. Blutung	innere	M. m. 5 M. stek- gross. Keine Extrakt.	2 tg. Fieb. 39.4, 39.6, darauf Be- fund gut	47 cm, 2500 gr, Kind wohl	
H. B., 34 Jhr., VI p.	Placenta præv. centr. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. wenig geöffnet? Keine Extr., da Kind tot	2 Tage fie- berfrei; 3. Tg. 38.6, 4. „ 39.6, 5. „ 40.2, 6. „ 39.4, 7. „ 40.0, fieberfrei	2800 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
G. M., 27 Jhr., IV p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb.	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Extr. nach vollst. erweit. M. m.	Mutter dauernd wohl	52 cm, 2950 gr, †	
R. A., 26 Jhr.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. Braxt.- Hicks	M. m. 3 M. stek- gross. Extr. nach erw. M. m. keine kdl. Herztöne	Mutter kein Fie- ber; anäm. Aussehen (Blutver- lust?) 900 gr	53 cm, 3300 gr, †	
Tr. L., 37 Jhr., IX p.	Placenta praev. later. Blutg. (stark) I. Querlage	direkt	M. m. hand- teller gross. Sinken d. kdl. Herzt. M. m. er- weitert. Sof. Extrakt.	Mutter †. Starke Anämie. Herzpara- lyse. Ato- nia uteri	50 cm, 3000 gr. 2° asphykt., wieder belebt	
E. B., 26 Jhr., VI p.	Placenta praev. later. Blutung. I. Querlage	direkt	M. m. fast völ- lig erweitert. Spont. Geb. d. Rumpfes. Veit-Smellie	Mutter gesund; kein Fieber	48 cm, 2750 gr. III° asphykt., † nach 1/3 Std.	
S. M., 36 Jhr., V p.	Placenta praev. centr. Blutung. Querlage des erst. Kindes v. Zwillingen	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Extr. nach erweit. M. m.	Befinden d. Mutter gut	47.5 cm, 2350 gr, †	
S. M., 36 Jhr., V p.	Placenta praev. centr. Blutung. Sek- und. Quer- lage d. zweit. Kindes von Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Spont. Geburt	Befinden d. Mutter gut	45 cm, 2100 gr, 1° asphykt., wieder belebt	
E. K., 39 Jhr., XI p.	Placenta praev. marg. Blutung. Na- belschnur- vorfall	direkt	M. m. für die ganze Hand durchgängig. Extrakt. da Herztöne auf- hören	Fieber v. 2.—11. Tg. zwischen 38.2 u. 39.6. dann fie- berfrei	57 cm, 3960 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
A. A., 35 Jhr., VII p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. hand- tellergröss. Spontange- burt bis zu den Schultern. Veit-Smellie	Fieber 1. Tg. 38,0, 2. " 40,9, 3. " 39,6, 5. " 41,3, 6. " 40,8, 7. " 40,0, † am 8. Tg.	53 cm, 3440 gr, II° asphykt., wieder be- lebt	Puerperal. Sepsis.
Sch. Th., 31 Jhr., VIII p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	gesund, kein Fie- ber	51 cm, 3840 gr, I° asphykt., wieder be- lebt	
H. M., 27 Jhr., III p.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. 5 M. steck- gröss. Spon- tangeburt. Veit-Smellie	Fieber am 1. Tg. 38,2, 2. " 40,0, 3. " 40,2, 4. " 40,2, 5. " 39,2, 6. " 41,1, 7. " 39,5, 8. " 40,3, 9. " 40,5, 10. " 40,7, 11. " †	48 cm, 3020 gr, II° asphykt., wieder be- lebt	Sekt.-Bef. Septico- pyämie.
K. Th., 29 Jhr., VII p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. fast völ- lig erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. Herzt.	Fieber am 4. Tg. 37,5, 5. " 37,6, 6. " 37,4, 7. " 37,4, dann fie- berfrei	47 cm, 2430 gr, I° asphykt., wieder be- lebt	Cervixriass I°.
B. M., 32 Jhr., VI p.	Placenta praevia. Blu- tung. Temp der Mutter 39,6	direkt	M. m. fast völ- lig erweitert. Sof. Extrakt. da M. m. nun völlig erwei- tet ist	Fieber am 1. Tg. 39,4, 2. " 39,0, 3. " 39,9, 4. " 39,2, 5. " 39,5, 6. " 38,9, 7. " 37,3, dann fie- berfrei	51 cm, 3990 gr, III° asphykt., †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
Sch. M., 21 Jhr., III p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. fast völ- lig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 3. Tg. 38.8. 4. „ 37.5. 5. „ 39.8, 6. „ 38.4, 7. „ 39.9, 8. „ 38.8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	45 cm, 2055 gr, gesund	Fraktur d. I. Ober- schenkels.
Sch. M., 28 Jhr., VI p.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. noch nicht für die Hand durch- gängig. Extr. sof. weg. geringer Grösse d. Kind.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	35 cm, 880 gr, †	
F. K., 29 Jhr., IV p.	Placenta praev. marg. Blutung. Conj. diag. 11 ¹ / ₄	direkt	M. m. nicht völ- ligerweit. Col- peuryse; völlig erweit. Spon- tane Geburt. Veit-Smellie	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2720 gr, † (Compress. der Nabel- schnur)	
W. S., 25 Jhr., IV p.	Placenta praev. later.	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extr. unregel- mäss. Herzt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2950 gr, gesund	
B. M., 38 Jhr., VIII p.	Placenta praev. later. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. 5 M. stek- gross. Zugge- wicht an d. ge- borenen Fuss. Spont. Geburt	Fieber v. 2.—10. Tg. zwischen 37.7 u. 39.4. dann fie- berfr., ge- sund entl.	50 cm, 3200 gr, aufgs. wohl. am 9. Tage †	
E. E., 39 Jhr., XV p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. fast völligerweit. Spont. Geburt	Fieber am 1. Tg. 38.5, 2. „ 38.3, 3. „ 38.8, 4. „ 38.0, 5. „ 37.6, 6. „ 37.7, 7. „ 37.8. dann fie- berfr., ges	54 cm, 4800 gr. Beginnende Maceration, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
W. B., 35 Jhr., VI p.	Placenta praev. centr. Blutung. Querlage	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Dauernd. Zug am gebor. Fuss. Spont. Geburt	Fieber am 1. Tg. 37.3, 2. „ 37.4, 3. „ 37.0, 4. „ 37.3, dann fie- berfr., ge- sund entl.	51 cm, 2900 gr, †	
M. F., 34 Jhr., V p.	Placenta praev. later.	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Belastg. Spont. Geburt	Fieber v. 2.—20. Tg. zwischen 39.7 u. 41.3, d. unt. 39.0	52 cm, 3000 gr, †	
L. Th., 28 Jhr., II p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. auf Tam- ponade hin für d. Hand durch- gängig. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 2500 gr, †	
Sch. M., 35 Jhr., IX p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spontane Geb. Veit-Smellie	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2870 gr, gesund	
E. L., 31 Jhr., I p.	Placenta praev. later. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spontane Geb.	Fieber am 4. Tg. 38.4, 5. „ 38.2, 6. „ 37.8, 7. „ 36.9, 8. „ 39.0, 9. „ 37.9, dann fie- berfr., ge- sund entl.	47 cm, 2720 gr, gesund	Nephritis der Mutter.
D. E., 31 Jhr., V p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 4 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Extr., da die Blutung nicht steht	Fieber am 1. Tg. 38.6, 2. „ 38.9, 3. „ 38.9, 4. „ 38.5, 5. „ 38.4, 6. „ 38.0, 7. „ 38.8, 8. „ 38.0, 9. „ 38.3, 10. „ 38.2, k. Fieber, gesund	45 cm, 2300 gr, II° asphykt., wieder be- lebt	Cervixriss.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
P. M., 26 Jhr., II p.	Placenta praev. later.	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	Fieber am 9. Tg. 40.7, 10. „ 39.2, 11. „ 39.4, 12. „ 38.4, 13. „ 38.4, 14. „ 39.2, 15. „ 38.2, kein Fieb., gesund	40 cm, 1200 gr, † nach 1/2 Std.	Cervixriss.
E. E., 40 Jhr., XVI p.	Placenta praevia. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Spont. Geburt	Fieber am 3. Tg. 37.6, 4. „ 38.8, 5. „ 38.5, dann fie- berfrei, gesund	46 cm, 1850 gr, †	
S. B., 39 Jhr., XIII p.	Placenta praevia. centralis. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 2330 gr, †	
B. A., 21 Jhr., II p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	kein Fie- ber, befin- det sich wohl	45 cm, 1900 gr, †	Mutter Lu.
Ph. B., 39 Jhr., VIII p.	Placenta praev. centr. Querlage	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3700 gr, I ^o asphykt., gesund	
G. A., 26 Jhr., IV p.	Placenta praev. later. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	kein Fie- ber; ge- sund entl.	49 cm, 2600 gr, †	
V. E., 33 Jhr., V p.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	Fieber am 4. Tg. 39.0, 5. „ 37.2, dann fie- berfr., ge- sund entl.	30 cm, 700 gr, †	
S. M., 33 Jhr., XIII p.	Placenta praev. part.	direkt	M. m. klein- handteller- gross. Spont. Geburt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 3100 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
L. A., 31 Jhr., VI p.	Placenta prae. centr. Querlage. Blutung	comb (Braxt- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. M. m. handt- gross. Extrakt.	Fieber am 6. Tg. 37.5, 7. „ 37.7, dann fie- berfr., ge- sund entl.	47 cm, 2600 gr, †	Cervixriss.
R. M., 35 Jhr., VIII p.	Placenta prae. centr. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Metreuryse. M. m. f. 3 Fing durchg. Zugg.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	28 cm, 520 gr, †	
F. R., 38 Jhr., VI p.	Placenta prae. later. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt	Fieber am 1. Tg. 38.2, 2. „ 37.8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	48 cm, 3500 gr, †	
S. J., 43 Jhr., XII p.	Placenta praevia. Blutung	direkt	M. m. f. 2 Fing. durchgängig Hysterotomie. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 2950 gr, asphykt., wied. belebt	Hystero- tomie.
F. M., 33 Jhr., VI p.	Placenta prae. marg. Querlage. Conj. ext. 17.0	direkt	M. m. völliger- weitert. Sof. Extrakt. Aufh. d. kdl. Herzt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2200 gr, †	
E. M., 44 Jhr., I p.	Placenta praevia. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig	† intrapar- tum	†	Partur. wurde vollst. anä- misch ein- geliefert.
W. Th., 41 Jhr., X p.	Placenta prae. later. Blutung	direkt	M. m. 3 M. stek- gross. Hyste- rotomie. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.6, 3. „ 38.0, dann fie- berfr., ge- sund entl.	48 cm, 2890 gr, gesund	Hystero- tomie.
R. M., 36 Jhr., VIII p.	Placenta praevia. Blutung	direkt	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Extr.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	45 cm, 1950 gr, †	Hystero- tomie.
Sch. W., 28 Jhr., IX p.	Placenta praevia. Blutung	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Extr.	gesund entlassen	40 cm, 1500 gr, †	Hystero- tomie; Per- foration d. nachfolg. Kopfes.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
T. M., 35 Jhr., VIII p.	Placenta praev. marg. Blutung	direkt	M m. 3M. stek. gross. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	45 cm, 2050 gr, gesund	Hystero- tomie.
D. M., 36 Jhr., II p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. völlig geschlossen. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	45 cm, 2070 gr, † nach 5 Tagen	Hystero- tomie.
B. M., 21 Jhr., II p.	Placenta praev. later. Blutung. Querlage	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Sof. Extrakt.	Fieber am 2. Tg. 38.0, 5. „ 39.5, dann fie- berfr., ge- sund entl.	47 cm, 2200 gr, † nach der Ge- burt	Cervix u. Scheiden- riss 1°.
G. M., 34 Jhr., IV p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. f. d. Hand durchgängig. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	28 cm, 500 gr, †	
L. J., 35 Jhr., IX p.	Placenta praev. marg. Fieber	direkt	M. m. 3M. stek. gross. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.5, 2. „ 38.6, dann fie- berfr., ge- sund entl.	46 cm, 2300 gr, †	Hystero- tomie.
R. Th., 32 Jhr., III p.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Extr. spä- ter. M. m. nicht völlig erweit.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	39 cm, 1200 gr, †	Cervixriss, Perforat. des nachf. Kopfes.
St. K., 39 Jhr., XV p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Langsamer Ex- trakt.	Fieber am 1. Tg. 38.3, 2. „ 37.8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	39 cm, 1250 gr, †	Perforat. des nach- folgenden Kopfes.
H. A., 23 Jhr., V p.	Placenta praev. marg.	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2550 gr, gesund	
L. M., 28 Jhr., VII p.	Placenta praevia. Blutung	direkt	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	41 cm, 1300 gr, †	Hystero- tomie; Per- foration d. nachfolg. Kopfes.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
G. L., 33 Jhr., V p.	Placenta praevia. Vor- zeitig. Lösg.	direkt	M. m. ge- schlossen. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	41 cm, 1600 gr, † nach 1 Tag.	Hystero- tomie.
D. M., 37 Jhr., IV p.	Placenta praevia. Blutung	direkt	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 1. Tg. 37,7, 2. „ 37,6, 3. „ 37,0, 4. „ 38,0, kein Fie- ber mehr, gesund	46 cm, 2350 gr, gesund	Hystero- tomie.
D. M., 26 Jhr., II p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. 1 M. stek.-gross. Sof. Extr.	Fieber am 2. Tg. 38,3, 3. „ 38,6, 4. „ 38,7, dann fie- berfr., ge- sund	46 cm, 2100 gr, † am 2. Tag	Hystero- tomie.
K. R., 28 Jhr., VI p.	Placenta praev. centr. Blutung. Querlage	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2400 gr, gesund	Hystero- tomie.
Sch. F., 35 Jhr., XIV p.	Placenta praevia. Blutung	direkt	M. m. ge- schlossen. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	32 cm, 800 gr, †	Hystero- tomie.
S. E., 32 Jhr., III p.	Placenta praev. centr. Blutung	direkt	M. m. 3 M. stek.-gross. Sof. Extrakt.	6 Tg. Fieb. bis 38,0, dann fie- berfr., ge- sund entl.	40 cm, 1400 gr, †	Hystero- tomie.
F. J., 31 Jhr., III p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. klein- handtellergr. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 4150 gr, †	Hystero- tomie.
B. H., 24 Jhr., II p.	Placenta praevia	direkt	M. m. 2 M. stek.-gross. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	41 cm, 1600 gr, †	Hystero- tomie.
Z. M., 41 Jhr., VIII p.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. M. m. völlig erweitert. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2700 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
H. J., 25 Jhr., IV p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	Colpeuryse. M. m. völlig erweitert. Spont. Geburt	Fieber am 2. Tg. 37.6, 3. „ 37.6, 4. „ 37.4, 5. „ 37.3, 6. „ 37.6, dann fie- berfr., ge- sund entl.	51 cm, 3350 gr, gesund	
B. J., 37 Jhr., III p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sin- ken d. Herzt.	Fieber v. 2.—11. Tg. zwischen 38.0 u. 39.9, dann fie- berfr., ges.	54 cm. 3390 gr. †	
K. K., 40 Jhr., XIX p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.4, 2. „ 38.5, 3. „ 38.8, 4. „ 38.3, 5. „ 38.3, 6. „ 38.4, 7. „ 39.0, 8. „ 36.9, d. fieberfr., gesd. entl.	46 cm, 2070 gr, †	
H. W., 27 Jhr., VI p.	Placenta praevia. Blutung.	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. 5 M. stek.-gross Zuggewicht. Spont. Geburt	† 3 Std. post partum	46 cm, 2090 gr, gesund	
S. A., 28 Jhr., III p.	Placenta praev. marg Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Extrakt. nach völlig erweit. M. m.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 3150 gr, gesund	Dammriss II ^o
K. M., 34 Jhr., VIII p.	Placenta praev. later. Sehr starke Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spont. Geburt	† 10 Std. post par- tum	49 ³ cm, 2990 gr, †	
E. A., 43 Jhr., IV p.	Placenta praev. later.	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 2450 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
P. M., 20 Jhr., I p.	Placenta praevia. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m.5M.steck- gross. Zugge- wicht. Spont. Geburt	Fieber am 1. Tg. 37.8, 2. „ 38.4, 3. „ 39.2, 4. „ 37.8, 5. „ 38.0, 6. „ 37.7, dann fie- berfr., ge- sund entl.	46 cm, 2250 gr, †	Cervixriss
B. H., 38 Jhr., X p.	Placenta praev. marg. Stark. Blut.	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m.5M.steck- gross. Zuggewicht	† nach der Wendung	56 cm, 4150 gr, †	
B. R., 31 Jhr., IV p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. handt- gross. Langs. Extr.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	41 cm, 1550 gr, †	
K. M., 41 Jhr., XV p.	Placenta praev. lat. Blutung Querlage	direkt	M. m. klein. handtellergr. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne	Fieber am 1. Tg. 37.6, 2. „ 38.5, 3. „ 39.3, 4. „ 37.8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	41 cm, 1240 gr, † post part.	
A. K., 26 Jhr., II p.	Placenta praev. Blutung	direkt	Colpeuryse. M. m. fast völ- lig erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne	Fieber v. 3.—11. Tg. zwischen 37.8 u. 39.0 dann fie- berfr. ges.	46 cm, 1850 gr, † post part.	
G. J., 39 Jhr., VII p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 3350 gr, †	
K. A., 32 Jhr., VI p.	Placenta praev. marg. Blutung	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Extr. nach völ- lig erw. M. m.	kein Fie- ber, ge- sund entl	46 cm, 2660 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
G. K., 33 Jhr., III p.	Placenta praev. later. Blutung	direkt	M. m. fast erw. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne	Fieber am 2. Tg. 38.0. d.fieberfr., ges. entl.	52 cm, 3270 gr. gesund entl.	Frakt. d. r. Oberarms.
J. B., 28 Jhr., V p.	Placenta praev. marg. Blutung	direkt	M. m. für die Hand durch- gäng. Langs. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 3300 gr, †	
G. J., 19 Jhr., III p.	Placenta praev. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Extrakt. nach erw. M. m.	Fieber am 1. Tg. 38.1, 2. „ 37.7, 3. „ 37.3, 4. „ 37.7, dann fie- berfr., ge- sund	39 cm, 1060 gr, †	
K. R., 29 Jhr., IX p.	Placenta praev. centr. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	44 cm, 1875 gr. †	
M. A., 36 Jhr., IV p.	Placenta praevia. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spont. Geburt	Fieber am 3. Tg. 37.8, 4. „ 38.2, 5. „ 37.5, 6. „ 38.5, 7. „ 38.4, dann fie- berfr. ge- sund	47 cm, 2270 gr. gesund	
St. A., 32 Jhr., XI p.	Placenta praev. later. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Zuggew. Spont. Geburt	Fieber am 6. Tg. 38.7, 7. „ 38.2, 8. „ 39.1, 9. „ 38.4, 10. „ 36.3, 11. „ 38.5, 12. „ 37.9, 13. „ 38.6, dann fie- berfr., ge- sund	35 cm, 1010 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
W. A., 39 Jhr., VII p.	Placenta praevia. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M.m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Spon- tane Geburt.	Fieber am 2. Tg. 38.0, 3. „ 38.7, 4. „ 38.5, 5. „ 38.3, 6. „ 39.0, 7. „ 38.5, 8. „ 38.4, 9. „ 38.6, 10. „ 38.2, 11. „ 38.7, 13. „ 38.4, d. 38—38.5 dann fie- berfr. ges.	51 cm, 3400 gr, †	
R. A., 32 Jhr., VI p.	Placenta praev. tot. Blutung	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Spon- tane Geburt	Fieber am 1. Tg. 38.2, dann fie- berfr., ge- sund entl.	48 cm, 2500 gr, †	
G. F., 19 Jhr., I p.	Placenta praev. marg. Blutung	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 37.7, 2. „ 38.2, 3. „ 38.0, 4. „ 38.3, dann fie- berfr., ge- sund	47 cm, 2350 gr, gesund	Hystero- tomie.
M. Th., 40 Jhr., XIII p.	Placenta praevia Blutung	direkt	M.m. nicht völ- lig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entlassen	51 cm, 3350 gr, gesund	Cervix- riss I°.
H. C., 41 Jhr., XV. p.	Placenta praevia Blutung	direkt	M. m. nicht erweitert Sof. Extrakt.	fieberfr., gesund entlassen	43 cm, 2250 gr, †	Hystero- tomie.
E. B., 27 Jhr., II p.	Nabelschnur und Armvorfall	(innere comb.) direkt	Mutterm. erw. Sof. Extrakt. Sink. d. Herzt. v. kdl. Seite	gesund	asphykt. 2° wieder belebt	
B. Th., 44 Jhr., XIII p	Nabelschn.- Vorfall. Plac. praev. marg.	direkt	M.m. über 5 M. stck. gross. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne.	gesund entlassen	ausgetragen gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
D. V., 28 Jhr., VI p.	Armvorfall II. H. H. Lage	(innere comb.) direkt	M. m. vollst. erw. Extr. erst vollzogen, als d. kdl. Herzt. sinken	Fieber am 1. Tg. 38.0. 2. " 39.9, 3. " 40.3, 4. " 38.8, 5. " 37.3, 6. " 38.4, d. norm. Temper.	52 cm, 3500 gr, nach den ersten Tagen Dyspepsie z. Schlusse wohl	
E. Th., 28 Jhr., IV p.	Nabel- schnurvorf. Becken 1° verengt Conj. ext. 18	direkt	M.m. fast voll. erw. Sof. Extr. dauernd be- schleunigte Herztöne	gesund, kein Fieber	50 cm, 2800 gr, gesund	geringer Cervixriss.
J. N., 20 Jhr., I p.	Nabel- schnurvorf. Beschleunig. d. kdl. Herzt.	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt. Gefährd. Kind.	Am 1. Tg. Fieber, Temp. 37.7 d. fieberfr. ges. entl.	55 cm, 3500 gr. II° asphykt. †	leichter Scheiden- riss.
G. G., 38 Jhr., IX p.	Nabel- schnurvorf. Sinken d. kdl. Herzt	direkt	M. m. klein- handtellergr. Extr. n. 3 Min. stark, Sink. d. kdl. Herztöne	Fieber am 3. Tg. 39.0. 4. " 38.0, 5. " 38.5, d. fieberfr.	52 cm, 2800 gr, I° asphykt., wieder belebt	
K. A., 23 Jhr., II p.	Nabel- schnurvor- fall, Dieselbe ist pulslos	direkt	M.m. völl erw. Sof. Extr. Ge- fahr d. Kindes	kein Fie- ber, ges. entlassen	50 cm, 2950 gr, II° asphykt., wied. belebt	
H. K., 24 Jhr., III p.	Armvorfall II. H. H. Lage	direkt	M. m. völlig er- weitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herzt.	kein Fie- ber, ges. entlassen	48 cm, 2720 gr, ges. II° asph., wied. belebt	
M. M., 31 Jhr., VI p.	Vorf. d. puls. Nabelschn. Rhach. Beck. Exostose	direkt	M. m. fast völl. erw. Sof. Extr. u. Perf. d. nach- folg. Kopfes	kein Fie- ber, ges. entlassen	54 cm, 3300 gr, †	Perforat. des nach- folgenden Kopfes.
J. V., 24 Jhr., IV p.	Nabelschn.- und Arm- vorfall.	direkt	M. m. völl erw. Sof Extrakt. Sink. d. Herzt.	kein Fie- ber, ges. entlassen	50 cm, 2710 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
M. K., 25 Jhr., II p.	Nabel- schnurvorf- fall. Conj. Diag. 10.5	direkt	M. m. klein- handtellergr. Sof. Extrakt. Sinken der Herztöne	Fieber am 1. Tg. 38.5, 2. " 37.0, 3. " 37.6, 4. " 37.8, 5. " 37.8, d.fieberfr., ges. entl.	50 cm, 2515 gr, † nach einigen Atembe- wegungen	
S. Th., 33 Jhr., VII p.	Fuss-, Arm- und Nabel- schnurvorf.	direkt	M. m. fast völ- lig erweitert langsame Ex- traktion	Fieber am 2. Tg. 38.0, 3. " 37.9, dann fie- berf., ges.	56 cm, 2500 gr, Leben?	Damm- riss III ^o
Sch. J., 24 Jhr., IV p.	Nabel- schnur- vorfall	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. klein- tellergr. Lang- same Extrakt.	fieberfrei, gesund entlassen	52cm, 3170gr, asphykt. III ^o †	
F. M., 25 Jhr., I p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Gef. d. Kindes	Fieber am 2. Tg. 37.5, 3. " 38.0, d.fieberfr., ges. entl.	54 cm, 3760 gr, †	Damm- riss II ^o
N. A., 20 Jhr., I p.	Nabelschn.- und Arm- vorfall	direkt	M. m. klein- handtellergr. Spont. Geburt. Veit-Smellie	Fieber am 1. Tg. 37.6, 3. " 37.7, d. fiebfr. g	38 cm, 1030 gr, †	
R. W., 32 Jhr., IV p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. erwei- t. Sof. Extrakt. Gef. d. Kindes	kein Fie- ber, ges. entlassen	51cm, 2880gr, II ^o asphykt. †	
S. Th., 34 Jhr., VI p.	Nabelschn.- und Arm- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ges. entlassen	54cm, 3250gr. III ^o asphykt. †	
St. M., 28 Jhr., III p.	Vorf. beider Füsse bei II Schädell.	direkt	M. m. völlig erweitert Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ges. entlassen	47cm, 2100gr, I ^o maceriert, †	Lues?
G. M., 29 Jhr., III p.	Vorfall der recht. Hand u. d. linken Fusses	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ges. entlassen	50 cm, 3200 gr, †	
D. E., 41 Jhr., XII p.	Nabel- schnurvorf. Conj. ext. 17 1/2	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ges. entlassen	48 cm, 3000 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht	Bemer- kungen
R. B., 30 Jhr., XI p.	Nabel- schnur- vorfall. Conj. vera 10.5	direkt	Einführung einer Bougie Colpeuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	46 cm, 2350 gr, † nach 1 Std.	Künstl. Frühgeb. wegen eng. Beckens.
Sch. L., 30 Jhr., II p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Kindl. Herzt. 80	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm. 3520 gr, asphykt., wied. belebt. gesund	
St. K., 25 Jhr., II p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 3250 gr, †	
D. K., 22 Jhr., II p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3100 gr, †	Cervixriss.
R. M., 35 Jhr., VIII p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M.m. 5M. stek. gross. Spont. Geburt	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3050 gr, †	
L. B., 23 Jhr., I p.	Nabel- schnur- vorfall. Abweichen d. Kopfes	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. pulsl. Nabel- schnur	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2550 gr, †. Perforat. d. nachf. Kopfes	
M. A., 38 Jhr., VI p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3600 gr, gesund	
Sch. J., 26 Jhr., III p.	Nabel- schnur- vorfall	comb. (Braxt- Hicks)	M.m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Zugge- wicht. Dann Extrakt	Fieber am 1. Tg. 38.3, 2. „ 37.7, dann fie- berfr., ges	52 cm. 3300 gr. †	
F. U., 23 Jhr., III p.	Arm u. Na- belschnur- vorfall	direkt	M.m. 5M. stek. gross. Langs. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.0, 3. „ 38.0, dann fie- berfr., ge- sund entl.	50 cm. 3050 gr, †	
Sch. Th., 43 Jhr., XIV p.	Blutung g. Vorzeit. Lös. der normal- sitz. Placenta	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	47 cm, 3100 gr, gesund	Hystero- tomie.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
V. M., 37 Jhr., III p.	Nabel- schnurvor- fall. Abwei- chen des Kopfes	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sink.d. Herzt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	53 cm, 3520 gr (ohne Ge- hirn), †	Perforat. des nachf. Kopfes.
E. Th., 26 Jhr., I p.	Nabel- schnurvor- fall. Sinken der Herz- töne	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3050 gr, gesund	
W. K., 44 Jhr., VI p.	Vorfall des rechten Ar- mes u. einer Nabel- schnur- schlinge	direkt	M. m. völlig erweitert. Langs. Extr.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 2750 gr, gesund	
W. E., 21 Jhr., III p.	Vorfall der Nabel- schnur und eines Fusses	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Kompr.d.Na- belschnur	Fieber am 5. Tg. 37,8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	51 cm, 2650 gr, gesund	
B. M., 39 Jhr., V p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. hand- tellergr. Sof. Extrakt. Sink. d. Herztöne (40)	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 3070 gr, †	
L. M., 27 Jhr., II p.	Vorfall der Nabel- schnur u. der link. Hand	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herztöne	Fieber am 4. Tg. 38,5, 5. „ 38,0, 6. „ 38,0, 7. „ 37,5, 8. „ 40,5, 9. „ 39,0, 10. „ 39,5, 11. „ 38,5, dann fie- berfrei, gesund	52 cm, 3620 gr, gesund	Dammriss 11°.
W. H., 29 Jhr., V p.	Nabel- schnurvor- fall. Sinken d. kdl. Herz- töne	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2970 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mütter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
Sch. K., 41 Jhr., XVII p.	Nabel- schnurvor- fall. Conj. diag. 11.0	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sinken d. kdl. Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund entl.	52 cm, 3550 gr, gesund	
K. A., 37 Jhr., II p.	Nabel- schnur- vorfall. Hydramn.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Perforat.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	50 cm, 3100 gr (ohne Ge- hirn), †	Perforat. des nachf. Kopfes.
P. Th., 19 Jhr., II p.	Vorfall des link. Armes u. der puls- losen Nabel- schnur	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber v. 2.—10. Tg. zwischen 38.0 u. 40.9, dann fie- berfr., ge- sund	52 cm, 2300 gr, †	Lu.
S. A., 23 Jhr., III p.	Nabel- schnurvor- fall. Conj. ext. 18.0	direkt	M. m. für 2 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2600 gr, gesund	Hystero- tomie.
R. M., 34 Jhr., IX p.	Nabel- schnur- vorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	51 cm, 3100 gr, gesund	
F. Th., 34 Jhr., X p.	Becken I° verengt. Conj. diag. 10.5	direkt	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Colpeu- ryse. Völlig erweitert. Sof. Extrakt. Gef. des Kindes	gesund, fieberfrei	49 cm, 2940 gr, gesund	
S. A., 20 Jhr., I p.	Becken I° verengt. Conj. diag. 10.5, Conj. ext. 17.5	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	gesund, fieberfrei	50 cm, 2650 gr, †	Extrakt d. Kopfes ge- lingt nicht Nabelschn. pulslos. Perforat.
A. F., 25 Jhr., III p.	Becken II° verengt. Conj. ext. 16 1/2. Quer- lage	direkt	Colpeuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	gesund, fieberfrei	47 cm, 2420 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
R. B., 34 Jhr., II p.	Becken II° verengt Conj. Diag. 9 ³ / ₄	direkt	M.m. für 2 Fin- ger durch- gängig. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 37.9, 2. " 37.9, 3. " 38.2, dann fie- berfr., ges.	47 cm, 2400 gr, II° asphykt. †	Einleitung d. künstl. Frühge- burt. Hystero- tomie.
M. V., 29 Jhr., VIII p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 11. vera 9. Querlage.	direkt	M.m. völlig er- weit. (durch Colpeuryse.) Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	41 cm, 1800 gr, gesund	Künstliche Früh- geburt.
G. W., 23 Jhr., II p.	Becken I° verengt	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	50 cm, 2870 gr, Clavicular- frakt., † nach 1 Tage	Hebosteo- tomie.
H. A., 32 Jhr., VI p.	Beck. II° ver- engt. Conj. Diag. 9.5 Puls- losigk. d. vor- gef. Nabschn.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	52 cm, 2980 gr, gesund	Hebosteo- tomie.
L. M., 37 Jhr., IX p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne.	kein Fie- ber ge- sund ent- lassen	50 cm, 3520 gr, †	
W. A., 25 Jhr., IV. p.	Becken I° verengt. Gonj. ext. 18 ¹ / ₂	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 2. Tg. 38.6, 3. " 39.7, 4. " 38.2, 5. " 38.0, 6. " 38.0, 7. " 37.6, dann fie- berfr., ge- sund entl.	48 cm, 2420 gr, gesund	
S. M., 36 Jhr., XI p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10.5	direkt	Colpeuryse. M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	50 cm, 2750 gr, † nach 12 Std.	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
M. K., 40 Jhr., XII p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10.2. Quer- lage. Plac. præv. tot.	direkt	Metreuryse. M. m. hand- tellergröss. Zuggewicht. Spont. Geburt.	Fieber am 2. Tg. 37.4, 3. " 37.3, 4. " 37.5, 5. " 39.2, 6. " 38.1, 7. " 38.4, 8. " 38.7, 9. " 37.4, Wegen Mamma- absc. ad for. chi- rurg.	47 cm, 2460 gr, †	
R. M., 41 Jhr., X p.	Becken II° verengt. Conj. Diag. 10. Querlage	direkt	Metreuryse. M. m. nicht völlig erweit. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	46 cm, 2150 gr, †	Künstliche Früh- geburt.
M. F., 32 Jhr., VII p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10.5. Ablös. d. unt. Pla- centarrand.	direkt	Metreuryse M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 2. Tg. 38.0, dann fie- berfr., ge- sund entl.	43 cm, 2050 gr, † am 3. Tage	
B. M., 25 Jhr., III p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 11	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	50 cm. 3290 gr, gesund	
D. Th., 26 Jhr., III p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. (Abg. v. Mek)	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	55 cm, 3870 gr, gesund	
V. B., 34 Jhr., II p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	54 cm, 3880 gr, gesund	
K. M., 40 Jhr., III p.	Becken I° verengt. Conj. Diag. 10.5	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt. Sink. d. kdl. Herztöne.	kein Fie- ber, ge- sund ent- lassen	51 cm, 3610 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
B. A., 31 Jhr., IV p.	Becken II° verengt. Conj.diag. 10 Stirnlage	direkt	M. m. völlig erweitert. Tetanus d. Uterus. Extr.	† post. Extr. An. Diag. Ute- rusrupt.	55 cm, 3600 gr, †	Perforat. d. nachfolg. Kopfes.
H. J., 25 Jhr., II p.	Becken I° verengt Diag. 11 1/2. gr. Kind	direkt	Sofort. Extr. Sinken d. kdl. Herztöne. M. m. hand- tellergröss	gesund	50.5 cm, 3950 gr, gesund	
B. A., 33 Jhr., III p.	Becken 2° verengt Diag. 10	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sofort. Extr. Aufh. d. kdl. Herztöne	gesund	51 cm, 3200 gr, asphykt. 3°	
Th. Th., 36 Jhr., IV p.	Allgemein verengtes Becken Diag. 10. Sp. 21	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sofort. Extr. Sinken d. kdl. Herztöne.	gesund; am 8. Tage Infl. (39.1), am 15. Tg. ges. entl.	53 cm, 2950 gr, † Perfor. d. nachf. Kopf.	
K. M., 33 Jhr., I p.	Becken I° verengt Conj.ext. 185.	? direkt	M. m. völlig erweit. Sofort. Extrakt. Sink. d. kdl. Herz. unter 100.	gesund	55 cm, 3650 gr, †	
M. M., 38 Jhr., IV p.	Becken I° verengt. Diag. 10.5	direkt	M. m. hand- tellergr. Sof. Extrakt. Kind reitet auf der Nabelschnur	gesund	49 cm, 2450 gr, 1° asphykt. wieder belebt	
S. Th., 28 Jhr., IV p.	Becken II° verengt. Diag. 9.25	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sofort. Extr. Sinken d. kdl. Herztöne	gesund kein Fieber	41 cm, 1600 gr, †	
R. M., 31 Jhr., IV p.	Becken I° verengt. Conj. ext. 18 cm. Kopf tritt nicht ins Becken	direkt	M. m. vollst. erweitert. Abg. v. Mek. Sink. d. kdl. Herztöne. Sofort. Extr.	2×Schüt- telfr. und Fieber. 1. Tg. 39.6, 2. „ 39.2, 3. „ 39.0, dann fie- berfr., ges.	52 cm, 3750 gr, wohl	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
K. K., 29 Jhr., III p.	Becken 1° verengt. Diag. 10.6	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sinken d. kdl. Herztöne. Sofort. Extr.	4 Tage lang Fieb. von 38.2, dann ges.	54 cm, 3250 gr, (oh. Gehirn) † durch Nabel- schnurkomp.	Perforat. d. nachfolg. Kopfes.
R. F., 29 Jhr., III p.	Allgemein verengtes Becken 2°. Diag. 9½ Nabel- schnurvorf.	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sinken d. kdl. Herztöne. Sofort. Extr.	einmalige Temper- Steig. v. 38.1, dann kein Fieber, gesund	53 cm, 3710 gr, (oh. Gehirn) †	Perforat. d. nachfolg. Kopfes. Scheiden- und Dammriss.
B. A., 34 Jhr., III p.	Becken 1° verengt. Conj. ext. 17. I. Vorder- scheitelb.- Einstellung.	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sof. Extr. weg. Druckersch. a. den Mutterm- Lippen	Befinden gut; kein Fieber	52cm, 3870gr, stark dys- apnöisch. wied. belebt, gesund	
M. F., 39 Jhr., XIII p.	Becken 1° verengt. Conj. ext. 18¼. Kdl. Herzt. un- regelmässig.	direkt	M. m. vollst. erweitert. Sofort. Extr. Sinken. d. kdl. Herztöne.	Befinden gut; kein Fieber	50 cm, 2950 gr, gesund	
St. A., 23 Jhr., V p.	Becken 1° verengt. Conj. Diag. 10.5. Sink. d. kdl. Herzt. unter 100.	direkt	M. m. hand- tellergr. Sof. Extr. Gefahr des Kindes	Befinden gut; kein Fieber	53 cm, 3780 gr, II° asphykt. wied. belebt. gesund	
V. H., 27 Jhr., I p.	Becken 2° verengt. Conj. ext. 16½. Abg. v. Mekonium	direkt	M. m. hand- tellergr.; Sof. Extr. Bedrohl. Zustand d. Mutter-Puls 134	Mutter † nach ein. Tage (Herz- ermüd.)	49 cm, 2750 gr. II° asphykt. †	
M. F., 32 Jhr., V p.	Becken 1° vorengt. Conj. ext. 19.0 Diag. 10.5. Nichteintr. d. Kopfes	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieber am 1. Tg. 38.0, 2. „ 39.5, 3. „ 38.7, 4. „ 39.0, 5. „ 38.2, d. fiebfr., g.	46 cm, 2150 gr. II° asphykt. † (Pemphig. luet.)	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
L. E., 38 Jhr., I p.	Becken 2° verengt. Conj. ext. 16 ¹ / ₂	comb. (Braxt.- Hicks)	M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Extrakt. nach völlig erweit. M. m.	gesund kein Fieber	49 cm, 2800 gr, Frakt. hum. dextri. ges. entl.	Damm- riss I°.
F. Th., 32 Jhr., IX p.	Becken 1° verengt. Conj. Diag. 10.5	direkt	M.m. für 4 Fin- ger durchgän- gig; Metreu- ryse. M.m. er- weitert. Sof. Extr. Steigen d. kdl. Herzt.	gesund. kein Fieber	46 cm, 2500 gr, † am 3. Tage nach der Geburt	
P. A., 36 Jhr., IV p.	Becken 1° verengt. Conj. ext. 18.5	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr. Gef. d. Kindes	Fieber am 2. Tg. 37.8, 3. „ 37.5, 4. „ 38.0, 5. „ 37.8. dann fie- berfr., ge- sund entl.	51 cm, 3550 gr, † nach 4 Stund.	Damm- riss II°.
R. M., 34 Jhr., II p.	Becken 1° verengt Conj. Diag. 10.5. Nabel- schnurvorf.	comb. (Braxt.- Hicks)	Colpeuryse. M.m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Sofort. Extrakt.	gesund, kein Fieber	48 cm, 2200 gr, (ohne Gehirn) †	Perforat. d. nachfolg Kopfes.
M. R., 30 Jhr., VI p.	Becken I° verengt. Conj. ext. 18.0	direkt	Colpeuryse. M. m. völl. er- weit. Sofort. Extrakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	48 cm, 2700 gr, gesund	
G. M., 40 Jhr., VI p.	Becken 1° verengt. Conj. Diag. 11. Gr. Kind	direkt	M. m. völlig erweit. Sofort. Extrakt. Sink. d. kdl. Herzt.	Fieber am 7. Tg. 38.7, 8. „ 38.6, 9. „ 38.2, dann fie- berfr., ge- sund entl.	57 cm, 4860 gr, (ohne Gehirn und Blut). †	Kranio- klasie d. nachfolg. Kopfes.
G. B., 38 Jhr., VI p.	Sinken d. kdl. Herzt. Abgang v. Mekonium.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	53 cm, 3715 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
W. L., 39 Jhr., IV p.	Sinken d. kdl. Herzt.	direkt	M. m. fast völlig erweit. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	53 cm, 3500 gr, gesund	Forceps- versuch. Cervixriss II ^o .
K. A., 20 Jhr., I p.	Sinken d. kdl. Herzt. Abgang v. Mekonium	direkt	M. m. klein- handtellergr. Zuggewicht. Spont. Geburt.	Fieber am 5. Tg. 39.4, 6. „ 39.0, 7. „ 39.6, dann fie- berfr., ge- sund entl.	51 cm, 3400 gr, 2 ^o asphykt. wieder belebt, gesund	Dammriss II ^o .
B. E., 28 Jhr., IV p.	Aufhören d. kdl. Herzt. (2. Kind v. Zwillingen)	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieber v. 3.—10. Tg. zwischen 38.2 u. 38.8, d. fiebr., g.	45 cm, 2200 gr, 2 ^o asphykt. wied. belebt, gesund	
Z. M., 27 Jhr., III p.	Sinken d. kdl. Herzt. Abgang v. Meconium	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieber v. 4.—13. Tg. zwischen 38.0 u. 39.9, † 14. Tag	52 cm, 3600 gr, gesund	
B. A., 31 Jhr., II p.	Sinken d. kdl. Herzt. (2. Kind v. Zwillingen)	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	48 cm, 2600 gr, gesund	
B. Th., 24 Jhr., II. p.	Unregelm. Herztöne. (Nabelschn. kompress.?)	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	53 cm, 3450 gr, II ^o asphykt. wied. belebt, gesund	
M. E., 30 Jhr., II p.	Sinken d. kindl. Herzt. (Hydramn.)	comb. (Braxt. Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Extrakt. nach völlig er- weit. M. m.	fieberfrei, gesund entlassen	45 cm, 3040 gr, †	Perforat. d. nachfolg. Kopfes, da keine Herz- töne mehr vorhand.
G. W., 33 Jhr., III p.	Beschleunig. d. kindl. Herztöne	direkt	M. m. hand- tellergröss; Extrakt. nach fast völlig erweit. M. m.	fieberfrei, gesund entlassen	53 cm, 4200 gr, gesund	2 Cervix- risse von je 1 1/2 cm Länge.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
H. A. 28 Jhr., II p.	Beschleunig. d. kdl. Herzt. (dauernd 160)	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieber am 3. Tg. 37.2, 4. " 37.2, 5. " 37.0, 6. " 37.8, 7. " 37.2, 8. " 38.4, d. fieber- frei, ges.	ausgetrag. 51 cm, 3280 gr, gesund	
L. K., 32 Jhr., IV p.	Dauernde Verlangsam. d. kdl. Herzt.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	ausgetrag. 53 cm, 3220 gr, asphykt. II° †	
G. M., 20 Jhr., I p.	Sinken d. kdl. Herztöne d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	ausgetrag. 50 cm, 2980 gr, gesund	Dammriss 10.
M. M. 19 Jhr., I p.	Sinken d. kdl. Herztöne d. 2. Kindes v. Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	nicht aus- getragen. 43 cm, 1580 gr, † n. 1 Tg.	
B. Th., 36 Jhr., VI p.	Dauernde Verlangsam. d. kdl. Herz- töne	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	ausgetrag. 52 cm, 3300 gr, II° asphykt wied. belebt, gesund	
R. W., 30 Jhr., III p.	Sinken der kdl. Herzt. Mekonium- abgang	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	fieberfrei, gesund entlassen	ausgetrag. 57 cm, 4280 gr, asphykt. II° †	Forcep- versuch.
Z. E., 27 Jhr., III p.	Steigen der Herztöne d. 2. Kindes v. Zwillingen; Blutung bei jeder Wehe	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieber am 1. Tg. 37.8, 2. " 36.9, 3. " 37.8, 4. " 36.6, 5. " 37.1, 6. " 37.7, dann fie- berfr., ge- sund entl.	nicht aus- getragen. 39 cm, 1310 gr, † am 5. Tage	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
G. V., 22 Jhr., II p.	Sinken der kindl. Herz- töne	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	ausgetrag. 56 cm, 3866 gr, Befind. gut, Fraktur heilt gut	Humerus- Fraktur.
B. O., 30 Jhr., IV p.	Steigen der kindl. Herz- töne. Ellen- bogenvorfall	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	nicht aus- getragen. 44 cm, 2980 gr, gesund	
K. M., 40 Jhr., XVII p.	Sinken der kindl. Herz- töne. Mekon- iumabgang. Blutung	comb. (Braxt- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger durchgän- gig. Spontane Geburt. Veit- Smellie.	Fieber am 1. Tg. 38.2, 3. „ 37.6, 5. „ 38.0, 6. „ 38.0, 7. „ 38.2, 8. „ 38.2, fieberfrei, gesund entl.	55 cm, 3950 gr. †	
L. S., 26 Jhr., I p.	Steigen der kindl. Herzt. Mekonium- abgang	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	54 cm, 3700 gr. †	
M. J., 29 Jhr., IV p.	Sinken der kindl. Herz- töne unter 100. Wehen- schwäche	direkt	M. m. klein- handteller- gröss. Sof. Ex- trakt.	fieberfrei, gesund entl.	49 cm, gesund	Humerus- Fraktur.
G. A., 33 Jhr., IV p.	Wechseln d. kindl. Herzt. Mekonium- abgang	direkt	M. m. 5 M. stck-gröss. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	46 cm, 2600 gr, gesund	Hystero- tomie.
K. M., 37 Jhr., IV p.	Sinken der kindl. Herz- töne	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt. Nabelschnur- vorfall	fieberfrei, gesund entl.	55 cm, 3950 gr, gesund	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
E. Th., 36 Jhr., I p.	Sinken der kindl. Herztöne	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.5, 2. „ 37.5, 3. „ 37.6, dann fie- berfr., ge- sund entl.	50 cm, 2650 gr, gesund	Forceps wurde versucht.
B. F., 43 Jhr., X p.	Wechselnd d. kindl. Herzt. Mekonium- abgang	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	56 cm, 4670 gr, gesund	
D. M., 32 Jhr., VII p.	Steig. d. kdl. Herzt. (182). Oedem der Vulva	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	53 cm, 4100 gr, gesund	
R. A., 43 Jhr., I p.	Sink. d. kdl. Herztöne. L. Becken- verengung.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	50 cm, 3310 gr, gesund	
F. M., 29 Jhr., V p.	Steigen der kdl. Herzt. (dauernd üb. 160)	direkt	M. m. fast völlig erwe- itert. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	50 cm, 3490 gr, gesund	
M. Ch., 40 Jhr., III p.	Sinken der kindl. Herztöne	direkt	M. m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	53 cm, 2920 gr, †	
Sch. Th., 18 Jhr., I p.	Eklampsie	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. nach Colpeuryse 5 M. steck- gross. Langs. Extrakt.	Mutter †, am 2. Tg. post par- tum	43 cm, 1450 gr, †	
St. A., 27 Jhr., III p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Colpeuryse völlig erwe- itert. Sof. Extrakt.	Befinden gut, ge- sund entl.	46 cm, 2180 gr, gesund	
Z. M.	Eklampsie	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. für 3 Fin- ger, durchgän- gig. Langsam. Extrakt, da d. Kind klein ist	Mutter † (Nephri- tis, hypo- stat. Pneu- mon.)	43 cm, 1815 gr, II° asphykt., †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
K. M., 33 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M m. für die Hand durch- gängig. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 37.8. 2. „ 37.7, 3. „ 37.8, 4. „ 37.8, 5. „ 37.8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	50 cm, 3060 gr, gesund	linksseitig Cervixriss. Dammriss II°.
B. E., 19 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 3. Tg. 37.1. dann fie- berfr., ge- sund entl.	48 cm, 2270 gr, gesund	post part. noch 1 An- fall.
A. A., 27 Jhr., II p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Col- peuryse völlig erweitert. Sof. Extrakt.	fieberfrei. gesund entl.	43 cm. 1650 gr, †	post part. kein Anfall mehr.
V. A., 25 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Col- peuryse völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 37.4, 2. „ 37.2, 3. „ 38.4, 4. „ 37.5, 5. „ 36.9, dann fie- berfr., ge- sund entl.	50 cm, 2520 gr. I° asphykt., wied. belebt, gesund	
L. E., 22 Jhr., II p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Bossi Dilatat. handtellergr. Sof. Extrakt.	Fieber am 3. Tg. 37.5. 4. „ 37.5. dann fie- berfr., ge- sund entl.	55 cm, 4020 gr, gesund	Forceps- versuch Dammriss I°.
W. M., 26 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. durch langsame Ex- trakt. des 1. Kindes völlig erweitert. Sof. Extrakt. des 2. Kindes	Fieber am 1. Tg. 37.9, 3. „ 38.4, dann fie- berfr., ge- sund entl.	45 cm, 2340 gr, gesund	Gemini!

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
St. A., 32 Jhr., ? p.	Eklampsie	comb. (Braxt- Hicks)	Dilatation n. Bossi starke Blutung. Langsame Ex- trakt.	Fieber v. 4. — 29. Tg. zwischen 38 u. 40°, dann fie- berfr., ge- sundentl.	43 cm, 1600 gr, †	
W. J., 19 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. durch die Geburt d. 1. Kindes völlig erweitert. Sof. Extrakt. des 2. Kindes	Fieber v. 5 — 14. Tg. zwischen 38.3 u. 40.1, dann fie- berfr., ges.	48 cm, 2470 gr, gesund	Geminil Scheiden- riss. Damm- riss IIIo.
Sch. A., 28 Jhr., VII p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Bossi Dilatat. handtellergr. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund	43 cm, 1700 gr, †	Cervixriss bis zum Parametri- um.
R. W., 27 Jhr., II p.	Eklampsie	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	† post oper- rat. (De- caplat. beider Nieren)	49 cm, 3100 gr, asphykt., wied. belebt, gesund	Gemini. I. Forceps, II. Wendg.
W. M., 28 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	kein Fie- ber, ge- sund entl.	49 cm, 2700 gr, gesund	Hystero- tomie.
M. M., 29 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. völlig geschlossen. Sof. Extrakt.	† post ope- rationem	45 cm, 2350 gr, †, Perfor d. nachf. Kopf.	Hystero- tomie.
Sch. M., 23 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 1. Tg. 38.3, 12. „ 38.8, 13. „ 39.4, 14. „ 38.0, dann fie- berfr., ges.	47 cm, 2100 gr, †	Hystero- tomie.
E. M., 20 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	fieberfrei, gesund entl.	42 cm, 1680 gr, gesund	Hystero- tomie.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
K. M., 26 Jhr., II p.	Eklampsie	direkt	M.m. 5M. stck. gross. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 2. Tg. 37.7, 3. „ 38.0, 4. „ 37.7, 5. „ 37.7, dann fie- berfr., ge- sund entl.	55 cm, 4200 gr, gesund	Hystero- tomie.
M. M., 43 Jhr.	Eklampsie	direkt	M.m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 2. Tg. 39.5, 3. „ 39.8, 4. „ †	31 cm. 600 gr, †	Hystero- tomie.
E. A., 39 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M.m. geschlos- sen. Sof. Ex- trakt.	† am 6. Tag; post ope- rat; keine Anfälle mehr. Ekl. Verändg. d. Lunge	30 cm, 750 gr, †	Hystero- tomie.
F. A., 26 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M.m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	fieberfrei, gesund entl.	43 cm, 1700 gr, gesund	Hystero- tomie.
W. M., 17 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Bossi Dilatat. fast völlig er- weitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 1. Tg. 38.0, 2. „ 37.1, 3. „ 38.2, 4. „ 38.2, 5. „ 38.8, 6. „ 38.8, dann fie- berfr., ges.	39 cm, 1280 gr, †	
G. M., 26 Jhr., I p.	Eklampsie	direkt	M. m. nach Bossi Dilatat. fast völlig er- weitert. Sof. Extrakt.	Fieber zwischen 38 u. 40° während 23 Tagen, dann fie- berfr., ges.	47 cm, 2510 gr, †	
B. Fr., 27 Jhr., II p.	Eklampsie	direkt	M.m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	fieberfrei, gesund entl.	40 cm, 1500 gr, gesund	Hystero- tomie.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
H. Th., 32 Jhr., IV p.	Erschöpfung der Mutter	direkt	M. m. nicht völlig erweit. Sofort. Extr. Sinken d. kdl. Herztöne	4 Std. post part. ein Collaps Campher, Bef. gut, ges. entl.	51 cm, 3200 gr, † nach 4 Std.	2 kleine Cervix- risse
P. A., 27 Jhr., I p.	Erschöpfung d. Mutter. Kopf d. 2. Kindes noch üb. d. Becken	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr. Sinken d. kdl. Herztöne	Fieber am 2. Tg. 37.8, dann fie- berfr., ge- sund entl.	46 cm, 2400 gr, gesund	Das I. Kind wurde durch For- ceps ent- wickelt.
A. M., 23 Jhr., I p.	Erschöpfung der Mutter. Sinken der Herztöne d. 2. Kindes v. Zwilling.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieber am 3. Tg. 37.7, 4. " 39.9, 5. " 38.6, 6. " 38.5, 7. " 39.2, 8. " 38.8, 9. " 38.5, dann fie- berfrei, gesund	48 cm, 2780 gr, gesund	Das I. Kind durch Forceps entwickelt.
W. J., 44 Jhr., XVII p.	Erschöpfung d. Mutter. Cervix- stenose	direkt	M. m. für 2 Finger durchgängig. Sofortige Extraktion	Fieberfr., gesund entlassen	51 cm, 3600 gr, gesund	Hystero- tomie.
N. M., 32 Jhr., II p.	Sekundäre Wehen- schwäche	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieberfr., gesund entlassen	50 cm, 3720 gr, gesund	
R. B., 41 Jhr., VI p.	Blutung n. der Geburt des I. Kindes von Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieberfr., gesund entlassen	48 cm, 2340 gr, † nach 4 Tag.	
H. M., 34 Jhr., II p.	Blutung aus den Genitalien. Armvorfall	comb. (Braxt.- Hicks)	M. m. 5 M. stck. gross; Langsame Extraktion	Fieberfr., gesund entlassen	32 cm, 600 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
W. A., 22 Jhr., II p.	Blutung. Vorzeitige Placentar- lösung	direkt	M. m. klein- handtellergr. Langsame Extraktion	Fieber am 1. Tg. 37.9, 2. „ 38.7, 3. „ 38.1, 5. „ 37.6, dann fie- berfr., ge- sund entl.	42 cm, 1750 gr, †	Inzision d. Cervix. weg. Kon- traktur d. M. m. um den Hals.
W. E., 25 Jhr., I p.	Blutung. Vorzeitige Lösung der normal sitz. Placenta	direkt	M. m. 5 M. stek. gross. Sofort. Extr.	Fieber am 2. Tg. 38.2. 3. „ 38.8, 4. „ 38.0, dann fie- berfr., ge- sund entl.	† I° maceriert	Hystero- tomie. Zerstücke- lung.
K. R., 28 Jhr., VI p.	Blutung n. der Geburt des 1. Kindes von Zwillingen	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofort. Extr.	Fieberfr., gesund entlassen	50 cm, 3150 gr, gesund	
L. S., 38 Jhr., I p.	Temperatur d. Mutter 38.0, Puls 132. Mitral- insuff.	direkt	M. m. völlig erweitert. Sofortige Extraktion im Interesse der Mutter	Fieber am 1. Tg. 37.8, 2. Tg. 38.0, dann fieberfrei, gesund entlassen	50 cm. 2900 gr, †	
H. U., 25 Jhr., IV p.	Fieber 38.7 39.2	direkt	M. m. 3 M. stek. gross. Sofortige Extraktion	die ersten Tagenoch Fieber; dann gesund entlassen	50 cm, 3700 gr, gesund	Hystero- tomie.
V. Th., 31 Jhr., V p.	Fieber über 38.5	direkt	M. m. nicht völlig er- weitert. Spontane Geburt.	dauernd Fieber zwischen 38.5 u. 40 † am 15. Tage	54 cm, 3930 gr, †	Sekt.-Ref.: Puerperale Sepsis.

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt.?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
R. J., 39 Jhr., XI p.	Stark. Oedem der Vulva u. Vagina. Dyspnoe	direkt	M. m. durch Bossi Dilata- tion hand- tellergr. Sof. Extrakt.	† post ope- rationem	43 cm, 1850 gr, †	Sekt.-Bef.: Hydrotho- rax. Hydro- pericard. Schrumpf- niere. Pleu- ritis.
W. E., 23 Jhr., I p.	Oedem der Vulva. For- ceps beim 1. Kind der Zwillinge	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 3. Tg. 38.1, 4. " 38.9, 5. " 38.4, 6. " 39.4, 7. " 38.7, 8. " 37.8, 9. " 37.9, dann fie- berfr., ge- sund entl.	46 cm, 2390 gr, gesund	
Z. B., 31 Jhr., VI p.	Starke Aus- ziehung der unt. Uterin- segmentes	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 4. Tg. 37.5, 5. " 37.5, 6. " 37.5, dann fie- berfr., ge- sund entl.	50 cm, 3130 gr, †	Gemini. 1. Kind spontan ausser der Klinik ge- boren.
D. A., 39 Jhr., XII p.	Pyelitis	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Fieber am 1. Tg. 39.5, 2. " 39.7, 3. " 39.0, 4. " 38.5, 5. " 39.0, 6. " 38.3, dann fie- berfr., ge- sund entl.	47 cm, 2400 gr, gesund	Hystero- tomie.
M. H., 34 Jhr., IV p.	Pyeloneph- ritis, Cystis, Pleuritis	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	Am 7. Tg. fieberfrei, gesund entl.	48 cm, 2990 gr, †	Hystero- tomie.
M. Th., 22 Jhr., II p.	Tuberkulose im vorge- schrittenen Stadium	direkt	M. m. durch Colpeuryse völlig erwei- tert. Sof. Ex- trakt.	fieberfrei	50 cm, 3080 gr, †	

Name; Alter; ? p.	Indikation	Art d. Wendg.	Sofort. Extrakt. ?	Mutter	Kind (Länge; Gewicht)	Bemer- kungen
W. R., 36 Jhr., V p.	Broneho- pneumonie. Dyspnoe.	direkt	M. m. hand- tellergröss. Sof. Extrakt.	†	48 cm, 2500 gr, gesund	Hystero- tomie.
E. M., 36 Jhr., VII p.	Polyarthriti- s rheumatica	direkt	M. m. ge- schlossen. Sof. Extrakt.	gesund entl.	28 cm, 500 gr, †	Hystero- tomie.
O. M., 24 Jhr., II p.	Bedeutend- des Vitium cordis. Dyspnoe	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	11 Tage Fieber zwischen 39.2 u. 37.4, dann fie- berfrei	47 cm, 2770 gr, gesund	
W. J., 30 Jhr., I p.	Phthise. Verlängerte Geburts- dauer	direkt	M. m. völlig erweitert. Sof. Extrakt.	Fieber am 4. Tg. 38.7. dann fie- berfrei entl.	44 cm, 2200 gr, gesund	Das I. Kind der Zwill- linge durch Forceps entwickelt.
H. B., 28 Jhr., V p.	Ca. der vor- deren Mut- termunds- lippe	direkt	M. m. für 1 Fin- ger durchgän- gig. Sof. Ex- trakt.	† nach 3 Tg. (Peritoni- tis)	46 cm, 2300 gr, †	Colpoto- mia an- terior.
F. M., 30 Jhr., II p.	Erbrechen. Unwohlsein. Urin: E +	direkt	M. m. ge- schlossen. Sof. Extrakt.	fieberfrei, gesund entl.	42 cm. 1900 gr, am 3. Tag †	Hystero- tomie.

Aus diesen 368 Auszügen der Geburtsjournale ergeben sich in Kürze zusammengefasst nachstehende Resultate für Mutter und Kind:

I. Querlagen.

Bei 122 Querlagen wurde die Wendung gemacht; es starben bei diesen Geburten 2 Mütter und 53 Kinder; 109 mal wurde die direkte Wendung (innere Wendung) ausgeführt, 13 mal die kombinierte Wendung; bei der ersteren war eine Mortalität von 2 Müttern und 44 Kindern zu verzeichnen, bei der letzteren eine Mortalität von neun Kindern. Berücksichtigt man noch die Grösse des Muttermundes, so ergibt sich, dass 93 Geburten bei völlig erweitertem Muttermunde vor sich gingen, bei denen 38 Kinder starben; in 24 Fällen wurde bei nicht völlig erweitertem Muttermunde die Extraktion gemacht; hier starben 2 Mütter an Blutung ins Abdomen und 13 Kinder. Es waren noch 5 Fälle vorhanden, bei denen die Hysterotomie gemacht wurde, mit einer Mortalität von 2 Kindern. Aus den Wochenbettjournalen ist ersichtlich, dass bei 32 Müttern mehr oder wenig hohe Fiebertemperaturen vorkamen, während bei den übrigen das Wochenbett einen glatten Verlauf nahm. An mütterlichen Verletzungen durch die Wendung, bezw. Extraktion waren 4 Cervixrisse vorhanden; kindliche Verletzungen waren 4 Extremitäten- und 1 Wirbelsäulenfraktur.

II. Placenta praevia.

In 89 Fällen von Placenta praevia, in denen fast ausnahmslos stärkere Blutungen zu konstatieren waren, wurde die Wendung gemacht; die Zahl der toten Mütter betrug 8, und wie aus den Geburtsjournalen ersichtlich, starben 3 Mütter an Infektion, 5 an Anämie; die Mortalität der

Kinder stieg auf 61. In 49 Fällen war der Muttermund bereits so weit geöffnet, dass man zur direkten (inneren) Wendung schritt; es sind bei denselben 3 Mütter und 32 Kinder gestorben. In 40 Fällen musste kombiniert gewendet werden; die Zahl der toten Mütter erhöhte sich auf 5, während die Kindersterblichkeit annähernd gleich blieb, nämlich 29; von den 89 Geburten gingen 52 bei völlig erweitertem Muttermunde vor sich, bei denen sieben Mütter und 37 Kinder starben; bei 19 Geburten, in denen der Muttermund noch nicht völlig erweitert war und die langsame Extraktion gemacht wurde, starb eine Mutter, ehe die Extraktion vollzogen war und 12 Kinder. Ferner wurden 18 Hysterotomien gemacht, die für 12 Kinder einen negativen Erfolg hatten. Die Wochenbettjournale zeigen, dass bei 41 Müttern Fieber auftrat. An mütterlichen Verletzungen kamen 6 Cervixrisse vor, an kindlichen 2 Frakturen.

III. Vorgefallene Kindsteile.

42 Wendungen wurden vorgenommen wegen vorgefallener Kindsteile oder Nabelschnur; bei diesen Geburten starben 21 Kinder; direkt gewendet wurden 40 Kinder, von denen 19 starben; die 2 Kinder, die kombiniert gewendet wurden, starben gleichfalls. Bei Berücksichtigung der Grösse des Muttermundes ergibt sich, dass 26 Kinder bei völlig erweitertem Muttermunde geboren wurden, von denen 13 starben. Bei nicht völlig erweitertem Muttermunde starben von 14 Kindern 8. Zweimal wurde Hysterotomie ausgeführt und es wurden in beiden Fällen Mutter und Kind gesund entlassen. 12 Mütter erkrankten an Wochenbettfieber; bei 1 Mutter kam ein Cervixriss vor.

IV. Verengtes Becken.

Bei verengtem Becken wurden 37 Wendungen gemacht. 2 Mütter und 19 Kinder starben; in 35 Fällen konnte direkt gewendet werden; der Erfolg war für 2 Mütter und 18 Kinder ein negativer. Kombiniert wurden 2 Kinder gewendet, von denen eines starb, 29 Geburten erfolgten bei völlig erweitertem Muttermunde; die Mortalitätsziffer betrug in diesen Fällen 1 Mutter und 15 Kinder. Siebenmal wurde die Extraktion bei nicht völlig erweitertem

Muttermunde vollzogen, von diesen Fällen starben 1 Mutter und 3 Kinder. 1 Mutter wurde durch Hysterotomie entbunden (künstl. Frühgeburt), bei der das Kind starb. Den Wochenjournalen zufolge trat bei 11 Müttern Fieber auf. Von den beiden Müttern, bei denen der Tod eintrat, starb die eine an Herzermüdung, die andere an Verblutung in die Bauchhöhle (Uterusruptur). Bei 2 Kindern kamen Extremitätenfrakturen vor.

V. Gefahr des Kindes.

In 29 Fällen war die Indikation zur Wendung dadurch gegeben, dass das kindliche Leben in Gefahr war, was aus dem dauernden Steigen oder Sinken der kindlichen Herztöne oder dem Abgange von Mekonium hervorging. Von diesen 29 Fällen starben 8 Kinder. Von den 26 Kindern, die direkt gewendet wurden, starben 6. Dreimal musste kombiniert gewendet werden, was in 2 Fällen für die Kinder von negativem Erfolg war. In Hinblick auf die Grösse des Muttermundes erfolgten 22 Geburten teils spontan, teils durch Extraktion bei völlig erweitertem Muttermunde; die Mortalität betrug bei diesen Fällen 7 Kinder; sechsmal wurde bei nicht völlig erweitertem Muttermunde die Extraktion der Wendung angeschossen, in 1 Fall mit negativem Erfolg für das Kind. Ausserdem wurde noch eine Hysterotomie gemacht mit positivem Erfolg für Mutter und Kind. Bei 7 Müttern trat den Wochenbettjournalen zufolge Fieber auf. An mütterlichen Verletzungen war 1 Cervixriss zu verzeichnen, an kindlichen 2 Extremitätenfrakturen.

VI. Eklampsie.

24 Fälle von Eklampsie kamen vor, bei denen die Indikation auf Wendung gestellt wurde, um die eklamptische Schwangere möglichst schnell zu entbinden; 6 Mütter und 11 Kinder starben. Einundzwanzigmal konnte direkt gewendet werden; die Mortalität war bei diesen Wendungen 4 Mütter und 8 Kinder; die kombinierte Wendung musste dreimal ausgeführt werden; es starben hier 2 Mütter und 3 Kinder. Es sei auch hier wieder die Grösse des Muttermundes berücksichtigt. 7 Geburten erfolgten bei völlig erweitertem Muttermunde; 1 Mutter und 1 Kind starben.

Achtmal wurde bei nicht völlig erweitertem Muttermunde die Extraktion der Wendung angeschlossen, hier starben 2 Mütter und 6 Kinder. Ferner wurden noch 9 Hysterotomien gemacht, bei welchen die Zahl der toten Mütter 3, die der toten Kinder 4 betrug. Bei 18 Müttern waren Fiebertemperaturen post partum zu konstatieren. Der Tod der 6 Mütter war, soweit dies nicht schon durch Autopsie bewiesen, fast mit aller Sicherheit auf eklamptische Veränderungen, nicht auf die Wendung zurückzuführen. Bei den 24 Wendungen war 1 Cervixriss zu verzeichnen.

VII. Erschöpfung der Mutter.

„Erschöpfung der Mutter“ war in 5 Fällen die Indikation zur Wendung, die in 1 Falle mit negativem Erfolg für das Kind gemacht wurde. Bei sämtlichen Geburten wurde direkt gewendet. Es erfolgten 3 Geburten bei völlig erweitertem Muttermunde mit positivem Erfolg für Mutter und Kind. Einmal wurde das Kind bei nicht völlig erweitertem Muttermunde extrahiert; das Kind starb, bei der Mutter war ein Cervixriss vorgekommen. Ferner wurde eine Hysterotomie mit gutem Erfolg für Mutter und Kind gemacht. Nach den Wochenbettjournalen trat bei 2 Wöchnerinnen Fieber auf.

VIII. Blutung.

Fünfmal war die Indikation zur Wendung gegeben durch Blutung, die nicht von Placenta praevia herrührte. 4 Kinder starben. Viermal kam die direkte Wendung in Betracht, bei welcher 3 Kinder starben; einmal wurde kombiniert gewendet mit negativem Erfolg für das Kind. Bei völlig erweitertem Muttermunde wurden 2 Kinder geboren, von denen eines starb; in 2 Fällen wurde der Wendung die Extraktion bei nicht vollständig eröffnetem Muttermunde angeschlossen, beidemale mit negativem Erfolge für die Kinder. Ferner wurde einmal zur Hysterotomie geschritten, bei der das Kind gleichfalls starb. Mütterliche Verletzungen kamen nicht vor; bei 2 Wöchnerinnen traten Fiebertemperaturen auf.

IX. Anderweitige Indikationen.

Endlich sind noch 15 Fälle vorhanden, bei denen wegen anderer Indikationen, hauptsächlich akute und chronische Krankheiten der Mutter, die Wendung gemacht wurde, um die Schwangere möglichst rasch zu entbinden. 4 Mütter und 9 Kinder starben in diesen Fällen, und zwar wurde jedesmal die direkte Wendung gemacht. Ziehen wir noch die Grösse des Muttermundes in Betracht, so ergibt sich, dass bei völlig erweitertem Muttermunde 7 Geburten stattfanden, wovon 1 Mutter und 4 Kinder starben. In einem Falle wurde bei nicht völlig eröffnetem Muttermunde die Extraktion gemacht mit negativem Erfolge für Mutter und Kind. Siebenmal wurde zur Hysterotomie geschritten; hier starben 1 Mutter und 4 Kinder. Aus den Wochenbettjournalen ist ersichtlich, dass bei 11 Müttern Fieber auftrat. 2 Mütter starben an ihrer Krankheit; 1 Mutter starb an Peritonitis, 1 Mutter an puerperaler Sepsis.

Das Endergebnis ist nun folgendes: Von den 368 Wendungen starben 22 Mütter und 187 Kinder.

Die Sterblichkeit der Mütter berechnet sich infolgedessen auf 6,2%; dieser Prozentsatz ist insofern zu hoch genommen, als in manchen Fällen nicht die Geburt an sich in Betracht kam, sondern die zur Zeit bestehende Krankheit.

Die Sterblichkeit der Kinder betrug 50,8%.

Es ist nun noch zu bedenken, dass die Klinik mit ihren Hilfsmitteln jedenfalls ein weit günstigeres statistisches Ergebniss liefert, als es der Arzt hat, der draussen Geburtshilfe treiben muss, dass ferner die klinische Statistik in Bezug auf Muttersterblichkeit noch um einiges günstiger sein könnte, wenn bei den Schwangeren die Wendung rechtzeitig vorgenommen werden könnte, nicht erst, wenn von vorneherein die Aussicht auf einen günstigen Erfolg schon recht gering ist, wurden doch z. B. bei Placenta praevia allein 5 Kreissende eingeliefert, die im Zustande hochgradiger Anämie waren.

Nachdem bei den Auszügen der Geburtsprotokolle immer die Grösse des Muttermundes bei der Beendigung der Geburt berücksichtigt war, sei auch hier das Endergebnis angegeben. In 81 Fällen (= 22%) wurde die

Extraktion bei nicht völlig erweitertem Muttermunde der Wendung angeschlossen. In 242 Fällen (65.7%) ging die Geburt bei völlig erweitertem Muttermund teils spontan, teils durch Extraktion vor sich.

Bei völlig erweitertem Muttermunde war die mütterliche Mortalität 4.1%, die kindliche Mortalität 47.9%.

Bei Extraktion bei nicht völlig erweitertem Muttermunde starben 7 Mütter (= 8.6%) und 47 Kinder (= 58%).

Es mögen nun einige Vergleiche mit den Resultaten anderer Anstalten folgen. Ueber 194 Wendungen in der Baseler Klinik berichtet M. Chwiliwizky. Er fand als Gesamtmortalität der Mütter 3.6%, Mortalität der Kinder 28.5% gegenüber 6.2 bzw. 50.1% Gesamtmortalität in der Münchener Universitätsfrauenklinik. Hierbei kommt jedoch wesentlich in Betracht, dass Chwiliwizky nur Kinder in die Prozentzahl einrechnete, die direkt an der Wendung zugrunde gingen, während in unserer Statistik auch die Kinder eingerechnet sind, die an Zufällen starben und was ganz besonders zu erwähnen ist, Kinder, die erst einige Tage nach der Geburt starben, da man doch bei einem ganz oder nahezu ausgetragenen Kinde auf ein Geburtstrauma schliessen muss, wenn der Tod ohne äusseren Anlass während der ersten Tage post partum eintritt.

Bei Querlagen berechnet Chwiliwizky eine Kindermortalität von 18.4% gegenüber einer Sterblichkeit in hiesiger Frauenklinik von 44.1% kindlicherseits und 1.6% für Mütter.

O. Schwarzmeier hingegen fand in der Bonner Frauenklinik und Poliklinik bei Wendungen mit der Indikation Querlage eine Kindermortalität von 50%; diese Berechnung enthält, wie unsere, auch die Kinder, die während der nächsten Tage post partum starben.

Wie aus dem Berichte von Chwiliwizky zu entnehmen ist, war in der Baseler Klinik die Mortalität bei Wendung, die durch Placenta praevia indiziert war, 56.6% für Kinder und 8.8% für Mütter, gegenüber einer Sterblichkeit von 68.5 bzw. 8.9% in der Münchener Frauenklinik. Ähnliche Resultate fand auch Sonnenfeld (Monatsschrift f. Geburtshilfe u. Gynäkologie Bd. XX), der von 42 Wendungen bei Placenta praevia berichtet, wobei 29 Kinder starben, also ca. 69%.

S. Dembowska berichtet über 64 Fälle von prophelaktischer Wendung in der Züricher Frauenklinik. Nach seiner Angabe starben bei den Geburten 2 Mütter und 28 Kinder; auch hier sind die Kinder, die während der ersten Tage nach der Geburt starben, miteingerechnet. In hiesiger Klinik war unter 37 Fällen eine Mortalität von 2 Müttern und 18 Kindern; ernstere mütterliche Verletzungen waren nicht vorhanden, während in der Züricher Klinik 1 kompletter Dammriss und 1 Cervixriss zu verzeichnen waren.

Bei den übrigen Indikationen Vergleiche mit anderen Anstalten zu machen, würde wenig Zweck haben, da die Zahl der einzelnen Fälle so gering ist, dass von einer Wahrscheinlichkeitsziffer auch nicht annähernd gesprochen werden kann.

Zum Schlusse erfülle ich noch die angenehme Pflicht, Herrn Prof. Döderlein für die gütige Ueberlassung des Themas und Herrn Oberarzt Dr. Baisch für die freundliche Unterstützung bei Anfertigung der Arbeit meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Lebenslauf.

Unterzeichneter, geboren am 9. Januar 1884 zu Passau, besuchte von 1890 bis 1894 die Volksschule zu Passau; von 1894 bis 1903 war Unterfertiger im Kgl. Gymnasium zu Passau.

Im Wintersemester 1903/4 besuchte Unterzeichneter die Kgl. Universität München und verblieb an derselben bis Sommersemester 1905 (inkl.); die beiden nächsten Semester verbrachte er auf der Kgl. Universität Würzburg und bestand während dieser Zeit die medizinische Zwischenprüfung. Im Oktober 1906 begann er mit der Ableistung des ersten Militärhalbjahres und zwar beim Kgl. 2. Feldartillerieregiment in Würzburg. Vom Sommersemester 1907 bis Wintersemester 1908/9 (inkl.) war Unterfertiger wieder an der Kgl. Universität zu München. Zu Ende des Sommersemesters 1909 bestand er die medizinische Schlussprüfung in München und war dann vom 1. Oktober 1909 bis 1. Februar 1910 in der Kgl. pädiatrischen Poliklinik, vom 1. Februar 1910 bis 15. Juni 1910 in der Kgl. Universitäts-Frauenklinik zu München als Medizinalpraktikant tätig.

Fritz Baumann,
Medizinalpraktikant.

